Impfspicker für Baden-Württemberg

Hausärzteverband Baden-Württemberg

Kinder über 12 Jahre

- Grundimmunisierung regelgerecht begonnen?
  - ja → Nach Impfkalender weiterführen
  - nein → Nach Tabelle Nachholimpfungen* altersgerecht beginnen
- Grundimmunisierung abgeschlossen?
  - ja → Nach Impfkalender Auffrischungen fortführen
  - nein → Nach Tabelle Nachholimpfungen* altersgerecht ergänzen
- MMR 2x durchgeführt?
  - nein → Nachholen/ergänzen (Abstand von mind. 4-6 Wochen)
- Varizellenimpfung durchgeführt oder Varizellen gehabt?
  - nein → Varizellenimpfung 2x (Abstand von mind. 4-6 Wochen)
- Indikationsimpfungen?
  - z.B. FSME, Pneumokokken, Meningokokken, Influenza
- HPV-Impfung?
  - nein → Von 9-14 Jahren 2x (Abstand von 5 Monaten). Bei Nachholimpfung ab 14 Jahren oder Intervall < 5 Monate ist eine dritte Dosis nötig

Alle Infos zum Impfen und zur Impfstoff-Verordnung und Abrechnung: **hausarzt-bw.de/impfen**

Stand: Juli 2019 | *siehe EpiBull 34

Impfspicker für Baden-Württemberg

Hausärzteverband Baden-Württemberg

Erwachsene

- Auffrischungs-impfungen fällig?
  - Diphtherie (alle 10 Jahre)
  - Tetanus (alle 10 Jahre)
  - Pertussis, falls letzte Impfung länger als 10 Jahre her ist und enger Kontakt zu Neugeborenen
- Masern
  - Nach 1970 geboren → Nachholen wenn keine oder nur eine Impfung in der Kindheit (< 5 Jahre)
  - Bis 1970 geboren → Nicht erforderlich
- Hepatits B → Grundimmunisierung in jedem Alter möglich, falls noch nicht erfolgt oder abgeschlossen → Bei gesundheitlicher oder beruflicher Indikation Kontrolle von anti-HBs und ggf. Auffrischung
- Pneumokokken/ Meningokokken → Bei gesundheitlicher oder beruflicher Indikation, ggf. sequentielle Impfung
- FSME → Empfehlung für alle, insbesondere bei häufigem Aufenthalt in der Natur
  - Grundimmunisierung: 1. Impfung | nach 1-3 Monaten 2. Impfung | nach weiteren 5-12 bzw. 9-12 Monaten 3. Impfung
  - Auffrischung: 1. Auffrischung nach 3 Jahren, dann alle 5 Jahre →Encepur ab 50 Jahren alle 3 Jahre
- Herpes-Zoster-Totimpfung → Bei gesundheitlicher Indikation ab 50 Jahren

Impfspicker für Baden-Württemberg

Hausärzteverband Baden-Württemberg

Senioren > 60 Jahre

- Auffrischungsimpfungen fällig?
  - Diphtherie (alle 10 Jahre)
  - Tetanus (alle 10 Jahre)
  - Pertussis, falls letzte Impfung länger als 10 Jahre her ist und enger Kontakt zu Neugeborenen
- Influenza → Standardimpfung, jährlich
- Hepatits B → Grundimmunisierung in jedem Alter möglich, falls noch nicht erfolgt oder abgeschlossen → Bei gesundheitlicher oder beruflicher Indikation Kontrolle von anti-HBs und ggf. Auffrischung
- Pneumokokken → Standardimpfung, ggf. Wiederholung nach frühestens 6 Jahren
- FSME → Empfehlung für alle, insbesondere bei häufigem Aufenthalt in der Natur
  - Grundimmunisierung: 1. Impfung | nach 1-3 Monaten 2. Impfung | nach weiteren 5-12 bzw. 9-12 Monaten 3. Impfung
  - Auffrischung alle 3 Jahre
- Herpes-Zoster-Totimpfung → Standardimpfung, 2x im Abstand von mind. 2 und max. 6 Monaten

Alle Infos zum Impfen und zur Impfstoff-Verordnung und Abrechnung: **hausarzt-bw.de/impfen**

Stand: Juli 2019